

ВАКЦИНАЦИЯ ПОДРОСТКОВ ОТ COVID-19

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ



МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

КАКАЯ ВАКЦИНА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ ОТ COVID-19?

Двухкомпонентная вакцина **«Гам-Ковид-Вак-М»** (**«Спутник М»**) предназначена для профилактики COVID-19 у детского населения с 12 по 17 лет включительно.

Вакцина «Спутник М» прошла необходимые клинические испытания.

Состав вакцины полностью повторяет состав **«Спутник V»**, но концентрация его уменьшена в 5 раз. Такой состав позволяет сформировать иммунную защиту и легко переносится подростками. Так же как и «взрослая» версия, **«Спутник М»** вводится двукратно с интервалом 21 день.



ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ДОБРОВОЛЬНО?

Да, **ВАКЦИНАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ** по заявлению законных представителей (родителей и/или опекунов). Также заполняется информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств.

Если ребенок не достиг возраста 15 лет, то заявление и согласие оформляется от имени родителя (законного представителя) ребенка.

При достижении ребенком 15 лет и старше согласие может быть оформлено непосредственно как несовершеннолетним, так и родителем (законным представителем) ребенка. При этом заявление пишет только родитель (законный представитель) ребенка.

Все документы заполняются на месте.
С собой необходимо взять паспорт или свидетельство рождения подростка, полис ОМС.



ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПОДГОТОВКА К ВАКЦИНАЦИИ?

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
К ПРОВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ.**

Вакцинация проводится
только после осмотра
врача-педиатра.

Врач после консультации
определяет наличие
или отсутствие
противопоказаний.



КАКИЕ ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

- ✓ Гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- ✓ тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- ✓ острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- ✓ обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или наступления ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ - вакцинацию проводят после нормализации температуры.



КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА ПРИВИВКУ?

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ВОЗМОЖНЫ
ПОКРАСНЕНИЕ НА МЕСТЕ УКОЛА,
СЛАБОСТЬ, НЕБОЛЬШОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ВСЕ СИМПТОМЫ ПРОХОДЯТ В
ТЕЧЕНИЕ СУТОК, А ЗАЩИТА
ОСТАЕТСЯ НАДОЛГО!

